

Questionnaire sur le diagnostic précoce d'une neuropathie périphérique

Cher(e) patient(e),

La neuropathie périphérique est une lésion des nerfs qui peut survenir chez les patients atteints d'un cancer, à la suite de la maladie ou par la prise de certains médicaments.

Veillez remplir ce questionnaire. Celui-ci aidera votre médecin à détecter rapidement d'éventuelles lésions des nerfs et à en tenir compte dans votre thérapie.

Veillez indiquer votre réponse cochant la case correspondante.

OUI NON Etat de santé général

 Bon ?

Sensations anormales aux mains et/ou aux pieds

 Fourmillements, sensations de brûlure, picotements ("fourmilière")

 sensation d'engourdissement ou sensibilité réduite, sensation « d'endormissement » des mains et/ou des pieds

Douleurs

 Ces sensations anormales s'accompagnent-elles de douleurs ?

 Ressentez-vous une douleur lorsque vous touchez des objets chauds ou froids ?

 Ressentez-vous une douleur lors de contacts légers (par ex. avec des vêtements ou des draps) ?

Troubles généraux

 Manque de force ou sensation de faiblesse (par ex. pour monter des marches), insécurité en marchant sur un sol irrégulier, difficultés à écrire

 Difficultés à boutonner une chemise, à faire ses lacets, à tourner ou à utiliser de petits objets (par ex. une aiguille à coudre ou une agrafe)

 Troubles de l'audition (mauvaise audition, bourdonnement dans les oreilles, sonnerie)

 Sensation de vertige (par ex. en se levant)

 Accélération du rythme cardiaque, extrasystole, palpitations

 Troubles de l'érection, transpiration excessive ou sécrétion anormale de sueur (peau sèche)

 Troubles digestifs (ballonnements, constipation)

 Contractions musculaires, crampes

 Modification du goût